

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

14M - 10 mars 1992

## GRANDES CULTURES SEMENCES N° 3 - LUZERNE

(en collaboration avec la FNAMS et les SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

### APIONS - PHYTONOMES :

**Seuils d'intervention fréquemment atteints en toutes zones**

### ESCARGOTS :

**à surveiller également**

### APIONS - PHYTONOMES

Les températures printanières qui ont sévi depuis 3 semaines ont considérablement accéléré les évolutions.

Les seuils de nuisibilité de 100 adultes (apions) et 100 larves (phytonomes) sont fréquemment atteints en plusieurs secteurs (Béziers, Basse Vallée de l'Hérault), et même les plus tardifs (Alès).

#### # OBSERVEZ ET TRAITEZ au besoin à l'aide de :

- FASTAC (0,3 l.), KARATE (0,15 l.) qui assurent une bonne protection jusqu'à 3 semaines sur ces ravageurs.

- KARATE K (1,5 l.) et MAVRIK (0,2 l.) qui apportent une action supplémentaire intéressante sur pucerons.

# UTILISEZ le filet fauchoir (5 fois 5 coups) pour une intervention opportune, et en fonction de la rémanence des produits.

# REALISEZ le traitement après la précoupe si vous devez faire cette opération très prochainement. Les dégâts sont d'autant plus à craindre que la végétation est peu développée.



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON  
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5 / place Chaptal  
34076 MONTPELLIER CEDEX 1 - Tél. 67 92 41 42

Nouvelle adresse :  
ZAC D'ALCO - BP 3056  
34034 MONTPELLIER CEDEX 01  
Tél : 67.10.19.50



## ESCARGOTS

- le seuil de 50 individus en 5x5 coups de filet fauchoir est quelquefois largement dépassé (Biterrois)
- Ne vous laissez pas envahir ! : ces mollusques progressent à partir des bordures et après invasion de la luzernière en profondeur, l'efficacité des spécialités sous forme de granulés est plus aléatoire (sauf après précoupe)
- spécialités utilisables :
  - mercaptodiméthur (MESUROL) à 3 kg/ha (spécialité à 4%)
  - métaldéhyde (nombreuses spécialités) à 15-20 kg/ha (spécialité à 5%)
- Traitez de préférence en soirée au moment de l'activité des ravageurs

## CEREALES A PAILLE (Hérault et Gard)

### MALADIES DU FEUILLAGE :

**Très peu de manifestation, sauf ponctuellement pour l'oïdium**

-----> **ATTENDRE**

### STADES :

La majorité des parcelles se situent au stade 1 noeud, les situations les plus précoces étant au 2ème noeud bien formé.

### SITUATIONS

- \* Rouille brune : quasi-absente pour l'instant
- \* Oïdium : présent, mais essentiellement en situations de cultures denses, en zones sensibles et sur variétés sensibles.
- \* Fusariose : très peu observée.

### PRECONISATION

Accroître la surveillance à partir du stade 2 noeuds (un prochain avis fera un point plus précis)

## MAïs : dépliant de protection